

Qu'est-ce que les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV)?

Les entérocoques sont des bactéries qui se retrouvent normalement dans le système intestinal des humains. Ces bactéries peuvent parfois causer une infection. La vancomycine est un antibiotique utilisé pour combattre l'infection causée par des entérocoques. Une souche particulière d'entérocoque, connue sous le nom d'entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), a développé une résistance à la vancomycine.

Quels sont les signes et les symptômes de l'infection à l'ERV?

L'infection due à l'ERV se produit quand la bactérie envahit une partie du corps et se multiplie dans les tissus. Selon la région infectée, la personne peut présenter divers signes et symptômes de maladie tels que :

- fièvre;
- infection de plaies;
- inflammation/rougeur;
- infection des voies urinaires;
- pneumonie.

Comment se transmet l'infection à l'ERV?

L'infection à l'ERV se transmet généralement d'une personne à l'autre par contact direct avec des selles, de l'urine ou du sang contenant des ERV. Les personnes colonisées par les ERV peuvent transmettre l'infection à d'autres lorsqu'elles oublient de se laver les mains après être allées aux toilettes. D'autres personnes risquent alors de contracter l'infection en touchant les surfaces contaminées, comme les toilettes, les éviers ou d'autres objets, puis en portant la main à leur bouche ou en mangeant sans s'être lavée les mains au préalable. Comme les ERV peuvent survivre jusqu'à 7 jours dans l'environnement, les surfaces touchées fréquemment deviennent donc une source majeure de transmission des ERV. Les ERV ne se propagent pas dans l'air par la toux et les éternuements.

Gardez vos mains propres!

La meilleure manière de prévenir le MRSA (et les autres infections) de se propager, c'est de vous laver les mains. Lavez-vous les mains souvent :

- si elles sont sales;
- avant de préparer des aliments ou de manger;
- après vous être mouché;
- après avoir été aux toilettes;
- après tout contact avec des liquides corporels;
- après avoir changé un pansement.

Souvenez-vous!!

- Utilisez du savon et de l'eau ou un produit nettoyant pour les mains à base d'alcool.
- Si vous pouvez voir de la saleté sur vos main, un produit nettoyant pour les mains à base d'alcool ne suffira pas. Vous devrez les laver au savon et à l'eau.

Plus d'info?

PCI Canada (Prévention et contrôle des infections Canada)

<https://ipac-canada.org/antibiotic-resistant-organism-resources>

(en anglais seulement) .

Agence de la santé publique du Canada

<https://www.canada.ca/en/public-health/services/infectious-diseases/nosocomial-occupational-infections/vancomycin-resistant-enterococci.html>